Culebrilla

La culebrilla (herpes zóster) es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela.

La enfermedad

Síntomas comunes

Los síntomas más comunes de la culebrilla:

- Sarpullido
- Dolor

El dolor suele durar semanas o meses después de que el sarpullido haya sanado. Se lo conoce como "neuralgia posherpética" (PHN); algunas personas experimentan dolor causado por la culebrilla durante años después del episodio.

Cómo se propaga

Después de una infección de varicela, el virus vive en silencio en las células nerviosas. Luego puede reactivarse cuando el sistema inmunológico de una persona se debilita por la edad, una enfermedad o el estrés y provocar la culebrilla. Una persona susceptible a la varicela también puede contagiarse si tiene contacto directo con un sarpullido que no haya formado costra.



Vea algunas historias de personas que tuvieron culebrilla.

La vacuna

Motivos para recibirla

- Cualquier persona que haya tenido varicela puede contraer culebrilla.
- La culebrilla puede causar un dolor debilitante y prolongado.
- Las personas pueden tener culebrilla más de una vez.
- El contacto con un sarpullido de culebrilla puede causar varicela en alguien que nunca ha tenido varicela o que nunca ha recibido la vacuna.
- La vacuna es segura y efectiva.

¿Quién debería recibirla?

Las personas de 50 años de edad o más deberían recibir dos dosis de la vacuna contra el herpes zóster (culebrilla), incluso si previamente recibieron la versión anterior (llamada Zostavax).

©2024 The Children's Hospital of Philadelphia. 21147-2-24.

VISITE VACCINE.CHOP.EDU PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Children's Hospital of Philadelphia
Vaccine Education Center