

Meningococo

El meningococo es una de las enfermedades infecciosas más rápidas y abrumadoras que conoce el hombre. La mayoría de las personas expuestas al meningococo no se enfermarán, pero, para quienes sí lo hacen, la enfermedad puede volverse mortal rápidamente y provocar que una persona sana muera en cuestión de horas.

La enfermedad

Cómo se propaga

Generalmente, la infección meningocócica se contrae después del contacto íntimo con una persona infectada. El contacto íntimo incluye:

- Besarse
- Compartir alimentos o bebidas
- Permanecer en la misma casa o habitación (incluido un aula) durante más de cuatro horas al día

Síntomas y complicaciones

Los síntomas varían según las complicaciones que se producen.

Complicaciones de la enfermedad meningocócica



- Meningitis (50 de cada 100 personas)
- Sepsis (15 de cada 100 personas)
- Neumonía (10 de cada 100 personas)
- Amputación de extremidades, pérdida de la audición, injerto de piel, enfermedad renal, discapacidad intelectual (15 de cada 100 personas)
- Muerte (40 de cada 100 personas)

- Meningitis: inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal
- Sepsis: infección de la sangre
- Neumonía: infección de los pulmones
- Amputaciones de extremidades
- Pérdida de la audición
- Pérdida o daño de la piel que requiera injerto
- Enfermedad renal
- Discapacidades intelectuales
- Muerte

Aproximadamente 1 o 2 de cada 10 personas infectadas con meningococo morirán.

Las vacunas

Meningococo ACWY

Esta vacuna es similar a las del neumococo y del *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) en el sentido de que la protección contra la enfermedad se produce cuando se desarrollan anticuerpos contra la capa de azúcar (o polisacárido) que recubre la bacteria.

Meningococo ABCWY

Esta vacuna combina las dos vacunas contra el meningococo para proteger de los cinco tipos a la vez.



Meningococo B

El tipo B representa dos tercios de las infecciones meningocócicas en bebés y un tercio en adolescentes y adultos. La vacuna se elabora utilizando proteínas de la superficie de la bacteria.

¿Quién debe vacunarse contra el meningococo?



Se recomienda la vacuna contra el meningococo ACWY para todos los niños de 11 a 12 años, con una segunda dosis a los 16 años de edad. También se recomienda para algunas personas de otras edades que tienen mayor riesgo de infección.



La vacuna contra el meningococo B se recomienda en una serie de 2 o 3 dosis entre los 16 y 18 años de edad. También se recomienda para algunas personas con mayor riesgo de infección.

La vacuna contra el meningococo ABCWY se puede utilizar cuando una persona es elegible para recibir las vacunas contra el meningococo ACWY y meningococo B en la misma consulta.



VISITE [VACCINE.CHOP.EDU](https://vaccine.chop.edu) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.